

CALENDARIO DE VACUNACIÓN RECOMENDADO PARA ADULTOS	VACUNAS	GRUPOS DE EDAD		
		17 a 49 años	50 a 64 años	desde 65 años
	Doble Adultos (dT)	3 dosis ( A1 )		
	Triple Adultos (dTpa)	1 dosis ( A2 )		
	Antigripal	1 dosis anual		1 dosis anual
	Neumocócica Polisacárida	1 o 2 dosis ( B )		1 dosis
	Neumocócica Conjugada	1 dosis		1 dosis
	Hepatitis B	3 dosis		
	Hepatitis A	2 dosis		
	Triple Viral (sarampión, paperas, rubéola)	2 dosis ( C )		
	Varicela	2 dosis ( C )		
	Meningocócica conjugada serotipos: A, C, Y, W 135	1 dosis ( B )		
	Papiloma Virus (HPV)	Mujeres - 3 dosis desde 9 años		
		Hombres - 3 dosis solo con vacuna cuádruple y hasta 26 años		

- Para todas las personas pertenecientes al grupo de edad.
- Para personas con indicación específica por factor de riesgo.
- Para personas que NO tengan documentación que avale vacunación completa ó prueba de laboratorio positiva.

otras vacunas pueden ser recomendadas por el médico en situaciones particulares como viajes o patologías específicas.

**A:** Iniciar o completar esquema, luego 1 refuerzo cada 10 años.

Con esquema completo de 3 dosis refuerzo con 1 dosis cada 10 años.

**Se recomienda sustituir una dosis de doble adultos (dT: difteria, tétanos) por triple adultos (dTpa: difteria, tétanos, pertussis).**

**B:** Revacunar sólo en situaciones especiales por indicación médica. Las vacunas anti neumocócicas 7 polisacárida y conjugadas pueden utilizarse en esquemas combinados según indicación médica.

**C:** Contraindicada en el embarazo.

Luego de la vacunación evitar el embarazo durante 1 mes.

Evaluar su uso en inmunocomprometidos.



SWISS MEDICAL  
G R O U P